SIFSA
SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACION S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS

(DENGUE Y MALARIA)

VECTORES
DE DENGUE Y MALARIA

ANTECEDENTES

Todos los años **mueren más de medio millón de personas en el mundo** por causa de picaduras de mosquitos. Se trata, por mucho, del **animal más letal del planeta**.

La gran **mayoría** de estas **muertes** derivan de **enfermedades transmitidas** por **mosquitos del género Anofeles portador de la malaria**. Por su parte el **género Aedes Aegypti** es el mosquito vector que transmite la **fiebre amarilla** comúnmente conocida como **Dengue**, **Chikunguña** o **Zika**.

REPRODUCCIÓN

La hembra del mosquito elige a su víctima y **pica varias veces** al huésped. Después de **cada picadura**, el mosquito puede poner hasta **100 huevos**. El **crecimiento** poblacional es **exponencia**l, razón por la cual un adecuado programa de control de vectores resulta fundamental.

MEDIDAS DE CONTROL Y ELIMINACIÓN

Un **programa de fumigación** aplicado por **profesionales en control de vectores** es la mejor forma de reducir las probabilidades de afectación y transmisión de enfermedades a la población.

390
MILLONES
casos de dengue
cada año.

3.900
MILLONES
de **población**
en **riesgo.**

100
PAÍSES
adectados
por **epidemias.**

NUESTRO PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES:

FASE 1

El **control químico de vectores adultos** tienen por objeto reducir la densidad y la longevidad de los mosquitos transmisores lo que permite aplicar otras medidas de control vectorial a largo plazo. El tratamiento se aplica en el momento de mayor actividad de los mosquitos.

Cuando es esencial **reducir rápidamente la densidad de los vectores**, es recomendable efectuar el tratamiento de espacios **cada 2 o 3 días** durante un periodo de **10 días.**

Para determinar la frecuencia de la aplicación, es necesario dar seguimiento a las poblaciones de mosquitos y tratar las áreas de nuevo según sea necesario.

FASE 2

La **aplicación de insecticidas específicos en los hábitats** en donde existe actividad de larvas es de suma importancia para evitar la reproducción de nuevos mosquitos. El tratamiento generalmente se hace temprano en la mañana o de noche.

El ciclo de tratamiento dependerá de la especie del mosquito, de la estacionalidad de la transmisión, de la época del año, de la duración de la eficacia del larvicida y de los tipos de hábitats larvarios.

En **lugares de difícil acceso** así como en recipientes de agua potable resulta indispensable aplicar larvicidas de **baja toxicidad**; en todos los casos los productos aplicados deben contar con **registro sanitario**.

FASE 3

La **fumigación de interiores con efecto residua**l consiste en aplicar insecticidas con una acción **química de larga duración sobre las paredes y techos de las estructuras** a fin de eliminar los mosquitos vectores adultos que se posan y permanecen en esas superficies. El uso de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración es un excelente método complementario.



PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

Cualquier **programa profesional de eliminación** y **control de vectores** debe ir acompañado de **medidas de saneamiento básico** que eviten la creación de criaderos de mosquitos.

ACCIONES A SEGUIR POST-SERVICIO

- **LAVAR** con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para acumular agua.
- **TAPAR** todo recipiente en el que se almacene agua incluida el agua potable.
- **VOLTEAR** cubetas, tinas, macetas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua.
- **EVITAR** guardar llantas y recipientes que acumulen agua potable o de lluvia.
- **NO RETIRAR** el larvicida colocado por los profesionales en control de plagas.

ÁREAS VULNERABLES

El **mosquito** normalmente se encuentra en **el litorial** de la República Mexicana.

PRESENCIA DE PLAGA

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO
De 1/16 in a 3/16 in de largo

COLOR

PICADURA
Sí

ALAS
Sí

SUCURSALES

SUCURSAL CAMPECHE
Prolongación Pedro Moreno. Col. Sascalum, C.P. 24095
San Francisco de Campeche, Campeche.

SUCURSAL CANCÚN
Avenida La Costa. Supermanzana 32, Manzana 12 . Lote 10
Cancún, Quintana Roo.

SUCURSAL MÉXICO
Rosa Estrella 83, Col. Molino de Rosas. Álvaro Obregón,
C.P. 01470
CDMX.

SUCURSAL QUERÉTARO
Peña de Bernal 5131 A. El Refugio,
C.P. 76146
Santiago de Querétaro, Qro.

CONTACTO

ventas@sifsa.mx

México: (55) 5660 9946
Campeche: (981) 119 4504
Cancún: (998) 914 0270
Querétaro: (442) 415 0595